



CONSIGNES DE TRAITEMENT DE LA GALE

Avant de débuter le traitement, bien lire et bien comprendre chaque étape de ce document

1. Se procurer chez un commerçant :

- de grands sacs plastiques (Sac poubelle 100 litres)
- des gants plastiques à usage unique

2. Se procurer en pharmacie :

- spray **A-PAR**
- **Stromectol** comprimé 3mg à prendre à J1 et à J8 (à raison de 4cps / 60kg)
- Le traitement, à la posologie indiquée par votre médecin, est à prendre à jeun avec un peu d'eau. Ne débuter le prochain repas qu'une ou 2 heures plus tard.
- ATTENTION : le **Stromectol** n'est pas un produit miracle !

3. Traiter les proches, le linge, les objets et les locaux est indispensable

- Préparation et traitement du linge, des objets et des locaux le lendemain

1° Préparer pour chaque personne :

- vêtements propres pour la journée
- pyjamas propres pour le soir
- draps propres pour le soir

Dans ce contexte, propre signifie n'ayant pas été utilisé depuis 10 jours

2° Laver en machine à 60°C ce qui a été utilisé depuis 10 jours:

Exemples : linge, draps, dessus-de-lit...

3° Pour ce qui ne peut pas être lavé à 60°C et a été utilisé depuis 10 jours:

Exemples : couvertures, gants, chaussures...

- Mettre les effets dans un sac plastique (sac poubelle 100 litres).
- Eloigner les personnes asthmatiques.
- Pulvériser avec le spray **A-PAR** tous les effets.
- Fermer hermétiquement le sac et laisser agir pendant environ une demi-journée (10h00).

4° Pour tout ce qui ne peut pas se laver ou se mettre en sac plastique :

Exemples : literie, canapé, télécommande, sièges de voiture...

- Eloigner les personnes asthmatiques.
- Pulvériser avec le spray **A PAR**.
- Laisser agir pendant 10heures à 12heures.

Même si le traitement a été efficace, les démangeaisons peuvent persister 2 semaines.