

# KETAMINE®

## KETAMINE CHLORHYDRATE

Amp. 250 mg/5 ml. **Conservation dans les toxiques à l'abri de la lumière**

**FAMILLE** : Anesthésique dissociatif.

**DÉLAI D'ACTION** : 15-60 secondes IV.

**DURÉE D'ACTION** : 5-10 minutes IV.


**INCOMPATIBILITÉS PHYSICO CHIMIQUES :**  
**Barbituriques. Valium.**

**PRÉPARATION ET DILUTION : G5 %, NaCl 0,9 %.**

**IVD** : 100 mg (2 ml) dans 10 ml soit 10 mg/ml

**Administration sur 60 secondes.**

**Endormir le patient dans une ambiance calme.**



### POSOLOGIE :

**Idéalement passer un bolus d'hypnovel avant l'injection**

**Adulte (Induction)** : 2-3 mg/kg en IVL ou 5-10 mg/kg en IM.

**Adulte (Entretien)** : 1-3 mg/kg/heure IVSE ou 1-1,5mg/kg en IV après 15 minutes ou 4 mg/kg/20 minutes IM.

**Adulte (Sédation)** : 0,2-0,5 mg/kg.

**Enfant** : 1-2 mg/kg en IVL ou 5-10 mg/kg en IM ou IR.

**Chez l'enfant < 18 mois** : 3-4 mg/kg IVL.

### EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES : **Monitoring**

Hallucinations, agitation, troubles psychiques. Toux, hoquet.

**Dépression respiratoire et cardio-vasculaire.**

**Nausées, vomissements, laryngospasme.**