

Transfert intra-hospitalier d'un patient suspect d'infection à virus respiratoire émergent



Unité Fonctionnelle d'Hygiène

**Les précautions ci-dessous sont à appliquer en plus des précautions standard
ET dès la suspicion du cas.**

Abréviations : PHA/FHA : Produit/Friction Hydroalcoolique, DASRI : Déchets Activité de Soins à Risque Infectieux

LES TRANSFERTS DOIVENT ETRE LIMITES AU STRICT MINIMUM ET JUSTIFIES MEDICALEMENT

AVANT LE TRANSFERT

(service d'hospitalisation ou service transversal type radiologie)

- **Prévenir le service d'accueil qui anticipe :**
 - la préparation de la chambre ou de la salle d'examen
 - la prise en charge immédiate du patient (pas d'attente dans salle d'attente ou couloirs)
- **2 personnes au minimum sont nécessaires pour le transfert d'un patient**
 - Une personne ou plus qui assure(nt) le transport
 - Une personne qui ouvre le « chemin ». Elle assure un transfert fluide : ouverture de portes, ascenseur ; elle s'assure que le patient ne croise pas d'autres patients ou personnels en milieu clos (exemple : ascenseur).

Les stagiaires, les étudiants, les personnels immunodéprimés et les femmes enceintes sont EXCLUS des soins.

<p>Prise en charge du patient dans la chambre</p>	<p>Le personnel :</p> <ul style="list-style-type: none"> - revêt la tenue de protection avant d'entrer dans la chambre (selon protocole) - installe le patient sur le fauteuil ou le brancard <p>Le patient :</p> <ul style="list-style-type: none"> - met un masque chirurgical - réalise une FHA
<p>Sortie de la chambre et transfert</p>	<p>Le personnel conserve la tenue de protection pendant le transfert</p>
<p>Arrivée dans le service d'accueil</p>	<p>Prise en charge immédiate</p> <p>Installation du patient dans la chambre ou salle d'examen</p> <p>Sortie des personnels ayant effectué le transfert (retrait de la tenue selon protocole)</p>
<p>Bionettoyage du fauteuil ou brancard</p>	<p>Le service receveur met à disposition des accompagnants le matériel nécessaire pour le nettoyage et la désinfection du fauteuil ou brancard</p> <p>Revêtir un tablier et des gants</p> <p>Effectuer le bionettoyage du fauteuil ou du brancard selon le protocole « Clostridium »</p> <p>Eliminer la tenue de protection et les déchets dans un sac DASRI</p>