

FACTEURS DE HAUT RISQUE HÉMORRAGIQUE:

Poids inférieur à 60 kg.

Age supérieur à 75 ans.

ATCD d'AVC hémorragique ou ischémique.

ATCD de lésion du SNC.

Traumatisme crânien récent.

Altération de la fonction hépatique.

Ulcère gastro-duodéal évolutif.

Varices oesophagiennes connues.

Intervention chirurgicale récente.

Traitement par PLAVIX®, anticoagulants, AINS

TRÈS HAUT RISQUE

- Angor réfractaire
- Récidive de la douleur malgré un traitement anti-angineux maximal, avec dépression majeure du ST ≥ 2 mm, ou inversion profonde des ondes T
- Insuffisance cardiaque ou instabilité hémodynamique
- Arythmies ventriculaires graves (FV ou TV)

MOYEN A HAUT RISQUE

- Elévation de la troponine
- Modifications du ST ou de l'onde T
- Diabète
- Insuffisance rénale
- Altération de la fonction VG (FE < 40 %)
- Douleur angineuse précoce post IDM
- Angioplastie récente
- ATCD de pontage
- Score de Grace intermédiaire (109 à 140) à élevé (≥ 140)

BAS RISQUE

- Pas de récidive de la douleur
- Pas de signe d'insuffisance cardiaque
- ECG initial et de contrôle normaux
- Troponine initiale et de contrôle normales