



Extrait du Urgences-Online

<http://www.urgences-serveur.fr/spasfon-r-phloroglucinol,1709.html>

# Spasfon® - Phloroglucinol

- Protocoles - Préhospitalier - SMUR Etampes - Mémo Pharma SMUR IDE -



Date de mise en ligne : lundi 17 janvier 2011

---

Copyright © Urgences-Online - Tous droits réservés

---

## SPASFON® PHLOROGLUCINOL

**Amp.** 40 mg/4 ml.

**FAMILLE :** Antispasmodique musculotrope non atropinique, analgésique. Action au niveau digestif, urinaire et utérin.

**DÉLAI D'ACTION :** 10-15 minutes IV, 15-30 minutes IM.

**DURÉE D'ACTION :** 6-7 heures IV, 7-8 heures IM.

### **INCOMPATIBILITÉ PHYSICO-CHIMIQUE :**

Noramidopyrine (Viscéralgine®) dans la même seringue. L'association avec des morphiniques ou dérivés est à éviter en raison de leur effet spasmogène.

**PRÉPARATION ET DILUTION :** NaCl 0,9 %, G5 %, si dilution.

**Voie d'administration :** IV, IM.

**IVD :** Pas de dilution 10 mg/ml. Administration sur 2-3 minutes.

**IVL :** Dilution dans 100 ml sur 30 minutes.

**POSOLOGIE :** Administration dose/ poids, sans dilution.

Poids	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	>35 kg
Dose	2,5 ml	3,75 ml	5 ml	6,25 ml	7,5 ml	8 ml

### **EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES :**

Manifestations allergiques (rare) : éruption, urticaire, oedème de Quincke, hypotension artérielle pouvant aller jusqu'au choc.

**Antagoniste :** Adénosine triphosphate (Striadyne®) : [Accès direct à la fiche Adénosine triphosphate](#). [Accès direct au Mémodulable Adénosine triphosphate](#).