

ATRACRIUM®

BÉSILATE D'ATRACURIUM

Amp. 50 mg/5 ml.

Conservation au froid et à l'abri de la lumière

FAMILLE : Curare non dépolarisant.

DÉLAI D'ACTION : 3 minutes.

DURÉE D'ACTION : 20-40 minutes.

INCOMPATIBILITÉ PHYSICO-CHIMIQUES :
Solutés alcalins, pH neutre ou > à 6. Thiopental (Nesdonal). Barbituriques.

PRÉPARATION ET DILUTION : **NaCl 0,9 %, Ringer, G5 %.**

IVD : Pas de dilution 10 mg/ml. **POSOLOGIE** : 0,3 à 0,6 mg/Kg.

Administration sur 60 secondes.

PSE : 50 mg dans 50 ml, soit 1 mg/ml.

5 ml



Prélever 50 mg
soit une ampoule
50 mg/5 ml



45 ml



Ramener à 50 ml
avec du G5 %
ou du
NaCl 0,9 %



50 ml



On obtient
50 mg/50 ml
soit
1 mg/ml

Poids Posologie	50kg	60kg	70kg	80kg	90kg
0,3 mg/kg/h	15 ml/h	18 ml/h	21 ml/h	24 ml/h	27 ml/h
0,5 mg/kg/h	25 ml/h	30 ml/h	35 ml/h	40 ml/h	45 ml/h

EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES : **Monitoring**

Allergie, bronchospasme, rash, malade découvert pour surveiller l'état cutané. Hypotension artérielle, tachycardie.

Manipulation prudente du patient, risque de luxation à la mobilisation.