

# AUGMENTIN®

AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULINIQUE

Lyophilisat. 2 g/200 mg.

**FAMILLE** : Antibiotique de la famille des pénicillines, associé à un inhibiteur de bêta-lactamase.

**INCOMPATIBILITÉS PHYSICO-CHIMIQUES :**  
**Glucosés. Bicarbonates. Dextran. Corticoïdes.**  
**Dérivés sanguins.**

**PRÉPARATION ET DILUTION :** NaCl 0,9 %, Ringer, EPPI.

**2 g/200 mg IVL :** En perfusion dans 100 ml sur 30 minutes.

**POSOLOGIE PEDIATRIQUE :**

**Enfant < 3 mois :** 50 mg/kg/8 h en perfusion sur 30 minutes.

**Enfant de 3 mois à 12 ans :** 50 mg/kg/6 h dose en ml à passer en perfusion sur 30 minutes (1 flacon de 2 g dans 100 ml).

**2 g/200 mg dans un flacon de 100 ml de NaCl 0,9 %**

50 mg/kg	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg +
Dose à injecter	13ml	25 ml	38 ml	50 ml	63 ml	75 ml	88 ml	100 ml

**EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES :**

Éruptions cutanées allergiques ou non.

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées.

Effet antabuse.

Avant l'administration : réaliser si possible les prélèvements bactériologiques.

**Manifestations allergiques : urticaire, œdème, état de choc.**