

CELOCURINE®

SUXAMETHONIUM

Amp. 100 mg/2 ml.

Conservation au froid

FAMILLE : Curare dépolarisant d'induction.


DÉLAI D'ACTION : 1 minute.

DURÉE D'ACTION : 5-10 minutes.

INCOMPATIBILITÉS PHYSICO-CHIMIQUES :

Isuprel, barbituriques, soluté alcalin.

PRÉPARATION ET DILUTION : NaCl 0,9 %, G5 %.



POSOLOGIE :

Adulte : 1 mg/kg en IVD sur 30 secondes.

Enfant : Prémédication à l'atropine en pédiatrie 0,01 mg/kg.

Chez l'enfant < 18 mois : 2 mg/kg.

Chez l'enfant > 18 mois : 1 mg/kg.

EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES : **Monitoring Allergie, histaminolibération, malade découvert pour surveiller l'état cutané (rash). Bronchospasme,**

Hypersialorrhée, élévation des pressions intra-gastrique.

Trouble du rythme. Hyperkaliémie menaçante.

Fasciculations (à guetter avant IOT).

Manipulation prudente, risque de luxation à la mobilisation. Surveillance de la température (hyperthermie maligne).