

# CYANOKIT®

HYDROXOCOBALAMINE OU VIT. B12

Lyophilisat : 2,5 g.

**FAMILLE** : Antidote des intoxications à l'acide cyanhydrique.

## INCOMPATIBILITÉS PHYSICO-CHIMIQUES :

**Solutions de thiosulfate.**

**PRÉPARATION ET DILUTION** : 2,5 g par 25 ml de NaCl 0,9 %.

## POSOLOGIE :

70 mg/kg IVSE sur 30 minutes.

Renouveler si besoin 1 fois après 2 heures.

Renouveler la dose immédiatement en cas d'arrêt cardiaque ou d'instabilité hémodynamique persistante.

**PSE** : Prendre la quantité en ml indiquée dans le tableau, ramener à 50 ml et pousser au PSE à la vitesse de 100 ml/h.

<b>Nb de flacons</b>	<b>1 flacon dans 25 ml</b>		
<b>Poids</b>	10 kg	20 kg	30 kg
<b>2,5 g/25 ml (ml)</b>	7 ml	15 ml	21 ml

<b>Nb de flacons</b>	<b>2 flacons dans 50 ml</b>			
<b>Poids</b>	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg +
<b>2,5 g/25 ml (ml)</b>	28 ml	35 ml	42 ml	50 ml

## EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES : **Monitoring**

Coloration rouge des téguments, des muqueuses et des urines.

Douleur au point d'injection.