

DIPRIVAN[®]

PROPOFOL

Amp. 200 mg/20 ml

Conservation à l'abri de la lumière

FAMILLE : Anesthésique non barbiturique d'action rapide.

DÉLAI D'ACTION : 30 secondes.

DURÉE D'ACTION : 5-20 minutes.

INCOMPATIBILITÉS PHYSICO-CHIMIQUES :

Ne pas mélanger avec un autre produit (sauf la lidocaïne).

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les opiacés potentialisent très fortement l'effet hypnotique du propofol.

**PRÉPARATION ET DILUTION : G5 % si dilution nécessaire.
Agiter la seringue ou le flacon avant utilisation.**

IVL : Pas de dilution, soit 10 mg/ml.

Administration lente car injection douloureuse et mauvaise tolérance hémodynamique, sur voie veineuse de gros calibre.

PSE ou : Pas de dilution, soit 10 mg/ml.

POSOLOGIE :

Induction : 2 à 2,5 mg/kg

Entretien sédation en réanimation-SMUR : 1 à 2 mg/kg/h

EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES : **Monitoring**

Douleur au point d'injection. Nausées, vomissements, céphalées.

Choc anaphylactique.

Dépression respiratoire et cardiovasculaire.

Hypotension artérielle réversible à l'arrêt du traitement.

Bradycardie. Arrêt cardiaque.

