

ETOMIDATE®

ETOMIDATE

Amp. 20 mg/10 ml.

Conservation à l'abri de la lumière

FAMILLE : Anesthésique.

DÉLAI D'ACTION : 30 secondes à 2 minutes.

DURÉE D'ACTION : 4-6 minutes.

INCOMPATIBILITÉS PHYSICO-CHIMIQUES:

Aucune.

PRÉPARATION ET DILUTION : **Si besoin : G5 %, NaCl 0,9 %.**

IVD : Pas de dilution, soit 2 mg/ml.

Administration sur 30-60 secondes.

10 ml



10 ml



20 ml



Prélever 2 ampoules de 20 mg/10 ml dans une seringue de 20 ml

On obtient 40 mg/20 ml soit 2 mg/ml

POSOLOGIE : **0,3 à 0,5 mg/kg en IVD.**

Poids	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100kg
0,3 mg/kg	3 ml	4,5 ml	6 ml	7,5 ml	9 ml	11 ml	12 ml	14 ml	15 ml
0,4 mg/kg	4 ml	6 ml	8 ml	10 ml	12 ml	14 ml	16 ml	18 ml	20 ml
0,5 mg/kg	5 ml	7,5 ml	10 ml	12,5ml	15 ml	17 ml	20 ml	22 ml	25 ml

EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES : **Monitoring.**

Myoclonies à l'induction Nausées, vomissements, hypersialorrhée, douleur au point d'injection. Agitation au réveil.

Rash cutané à l'induction.

A éviter en entretien car risque d'insuffisance surrénalienne lors d'administration en continu.