

GARDENAL®

PHENOBARBITAL

Lyophilisat 40 mg, 200 mg.

FAMILLE : Antiépileptique majeur, sédatif et hypnotique.

INCOMPATIBILITÉS PHYSICO-CHIMIQUES :
Catécholamine. Insuline. HSHC. Morphine. Tétracyclines.
Vancomycine. Curares. Solutions acides.

PRÉPARATION ET DILUTION : SOLVANT, Eau PPI, NaCl
0,9 %.

POSOLOGIE :

IVSE: 200 mg + 4 ml de solvant, soit 50 mg/ml La vitesse d'administration ne doit pas dépasser 100 mg/min.		
POIDS (kg)	10 mg/kg	15 mg/kg
50	500 mg sur minimum 5 min. VIT 99 : 6 min. VIT 80 : 7 min.	750 mg sur minimum 7 min. VIT 99 : 9 min. VIT 80 : 11 min.
60	600 mg sur minimum 6 min. VIT 99 : 7 min. VIT 80 : 10 min.	900 mg sur minimum 9 min. VIT 99 : 10 min. VIT 80 : 13 min.
70	700 mg sur minimum 7 min. VIT 99 : 9 min. VIT 80 : 12 min.	1 050 mg sur minimum 11 min. VIT 99 : 13 min. VIT 80 : 15 min.
80	800 mg sur minimum 8 min. VIT 99 : 9 min. VIT 80 : 12 min.	1 200 mg sur minimum 12 min. VIT 99 : 15 min. VIT 80 : 18 min.
90	900 mg sur minimum 9 min. VIT 99 : 10 min. VIT 80 : 13 min.	1 350 mg sur minimum 14 min. VIT 99 : 16 min. VIT 80 : 20 min.
100	1 000 mg sur minimum 10 min. VIT 99 : 12 min. VIT 80 : 15 min.	1 500 mg sur minimum 15 min. VIT 99 : 18 min. VIT 80 : 22 min.

POSOLOGIE PEDIATRIQUE :

Nouveau-né : 20 mg/kg en IV sur 30 minutes.

Nourrisson : 15 mg/kg en IV sur 30 minutes.

Enfant de plus de 2 ans : 10mg/kg en IV sur 30 minutes.

EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES :

Dyschromatopsie, somnolence, trouble de la coordination et de l'équilibre.

Réactions cutanés (parfois graves).

Surveillance étroite d'un nouvel épisode d'EME.