

GLUCAGEN®

GLUCAGON

Lyophilisat. 1 mg.

Conservation au froid à l'abri de la lumière

FAMILLE : Hormone hyperglycémiante. Antidote des bêta-bloquants.

DÉLAI D'ACTION : 1 minute.

DURÉE D'ACTION : 15 minutes.

INCOMPATIBILITÉS PHYSICO-CHIMIQUES :
Phénytoïne (Dilantin).

PRÉPARATION ET DILUTION : **G5 %, NaCl 0,9%, Eau PPI.**

Voie d'administration : IM, SC, IV.

IVD : 1 mg dans 10 ml, soit 0,1 mg/ml.

Administration sur 2 minutes.

PSE : 10 mg dans 50 ml, soit 0,2 mg/ml.

POSOLOGIE :

Intoxication aux bêta-bloquants : Bolus de 50-100 µg/kg IVD puis 70 µg/kg/heure en entretien au PSE.

Bolus IVD : Administration sur 2 minutes						
Poids	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
50 µg/kg	2,5 mg	3 mg	3,5 mg	4 mg	4,5 mg	5 mg
70 µg/kg	3,5 mg	4,2 mg	4,9 mg	5,6 mg	6,3 mg	7 mg
100 µg/kg	5 mg	6 mg	7 mg	8 mg	9 mg	10 mg
Entretien PSE: 10 mg/50 ml, soit 0,2 mg/ml						
Poids	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
70 µg/kg/h	17,5 ml/h	21 ml/h	24,5 ml/h	28 ml/h	31,5 ml/h	35 ml/h

EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES :

Nausées, vomissements, hypocalcémie, hypokaliémie.

Surveillance cardiovasculaire si intoxication aux bêta-bloquants.

Conscience et glycémie capillaire si hypoglycémie.