

# HYPNOVEL®

## MIDAZOLAM

Amp. 5 mg/5 ml. Flac. 50 mg/10 ml.

**FAMILLE** : Benzodiazépine.

**DÉLAI D'ACTION** : 2 minutes IV, 5 minutes intra-nasal, 15 minutes intra-rectal.

**DURÉE D'ACTION** : 10-20 minutes IV, 30-60 minutes intra-nasal.

### INCOMPATIBILITÉS PHYSICO-CHIMIQUES:

**Aucune.**

**PRÉPARATION ET DILUTION** : **NaCl 0,9 %**, **G5 %**, **Eau PPI.**

**IVD** : Pas de dilution 5 mg/5 ml, soit 1 mg/ml.

**Administration sur 20-30 secondes.**

**PSE : 50 mg/50 ml, soit 1 mg/ml**

10 ml



Prélever 50 mg dans un flacon de 50 mg/10 ml



40 ml



Ramener à 50 ml avec du NaCl 0,9 % ou du G5 %



50 ml



On obtient 50 mg/50 ml soit 1 mg/ml

**EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES** : **Monitoring.**

Amnésie et anxiolyse.

Agitation et trouble du comportement.

**Douleur au point d'injection.**

**Dépression respiratoire, tachycardie, hypotension artérielle.**

**Antagoniste** : Flumazénil (Anexate).