

# ISUPREL®

## ISOPRENALINE

Amp. 0,2 mg/1 ml. **Conservation et administration à l'abri de la lumière**  
**Conservation au froid**


**FAMILLE** : Sympathomimétique.

### INCOMPATIBILITÉS PHYSICO-CHIMIQUES :

**Solutés alcalins. Aminophylline. Xylocaine. Barbituriques.**  
**Dilantin. Celocurine. Digitaliques. IMAO.**

**PRÉPARATION ET DILUTION : G5 %.**

**PSE : 1 mg (5 amp) dans 50 ml, soit 20 µg/ml**



**POSOLOGIE** : 0,05-0,2 µg/kg/min.

Vitesse ml/h	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg
0,05 µg/kg/mn	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5
0,1 µg/kg/mn	3	6	9	12	15	18	21	24	27
0,15 µg/kg/mn	4,5	9	13,5	18	22,5	27	31,5	35	40,5
0,2 µg/kg/mn	6	12	18	24	30	36	42	48	54

**EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES : **Monitoring.****

**Tremblements, céphalées.**

**Palpitations, tachycardie, vasoplégie, troubles du rythme ventriculaire. Hypotension artérielle. Douleur angineuse.**

**Choc anaphylactique.**

**Antagoniste** : Bêta-bloquants.