

KRENOSIN®

ADENOSINE

Flac. 6 mg/2ml

FAMILLE : Antiarythmique.

DÉLAI D'ACTION : immédiat

DURÉE D'ACTION : 1 à 2 minutes

INCOMPATIBILITES PHYSICO-CHIMIQUES :

Dipyridamole, théophylline, caféine

PRÉPARATION ET DILUTION : NaCl 0,9 %

Pas de dilution 3 mg/ml : IVD flashsur 2 secondes

Prélever uniquement la dose à administrer.

Rinçage rapide de la ligne de perfusion après administration.

POSOLOGIE :

1^{er} dose : 3 mg

2^{ème} dose : 6 mg

3^{ème} dose : 12 mg

EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES : **Monitoring**

Patient sous O2, et prévenu des effets indésirables :

sensation de mort imminente, arrêt cardiaque, flush.

ECG en continu.

Surveillance hémodynamique étroite durant l'heure qui suit l'injection.

Bronchospasme.

Asystolie, bradycardie, pause sinusale.

Tachycardies ventriculaires.

Bloc auriculo-ventriculaire.

Extrasystoles, tachycardies sinusales, palpitations.

Fibrillations, Torsades de pointe.

Sensation d'oppression, douleurs thoraciques.