

METALYSE®

TENECTEPLASE

Lyophilisat et solvant. 10 000 U (50 mg)/10 ml.

FAMILLE : Thrombolytique spécifique d'origine humaine.

DÉLAI D'ACTION : 30 minutes.

DURÉE D'ACTION : 2 heures.

INCOMPATIBILITÉ PHYSICO-CHIMIQUE :

Aucun autre médicament ne doit être mélangé à la solution injectable.

Incompatible avec G5 %, utiliser du NaCl 0,9 % pour la ligne de perfusion.

PRÉPARATION ET DILUTION : **SOLVANT.**

NaCl 0,9 %, Eau PPI possible.

IVD : Seringue prête à l'emploi.

Administration sur 5-10 secondes.

POSOLOGIE : La dose est déterminée par le poids du malade et indiquée sur la seringue.

La dose doit être administrée sous forme d'un bolus intraveineux unique.

EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES : **Monitoring Surveillance ECG.**

Risque hémorragique majeur.

Éviter les prélèvements artériels.

Pas d'IM, de dextro et ne pas enlever de cathéter.

Embolies périphériques.

Hyperthermie, nausées et vomissements.

Il peut se produire une arythmie de reperfusion myocardique.