

NARCAN®

NALOXONE

Amp. 0,4 mg/1 ml.

Conservation à l'abri de la lumière

FAMILLE : Antagoniste des morphiniques.

DÉLAI D'ACTION : 1-2 minutes IVD, 3 minutes en IM ou SC.

DURÉE D'ACTION : 20-30 minutes en IVD, 2,5 à 3 heures en IM ou SC.

INCOMPATIBILITÉS PHYSICO-CHIMIQUES :

Aucune.

PRÉPARATION ET DILUTION : **G5 %, NaCl 0,9 %.**

Voie d'administration : IV, SC, IM.

IVD : 0,4 mg dans 10 ml, soit 0,04 mg/ml.

Administration d'1 ml sur 15 secondes.

Administer ml par ml toutes les 2 minutes.

PSE : 0,8 mg (2 amp.) dans 20 ml soit 0,04 mg/ml.

POSOLOGIE :

Réveil : Injecter ml par ml en IVD toutes les 2 minutes jusqu'à obtenir une ventilation spontanée suffisante (FR : 12-14/min).

Entretien: dose horaire identique à celle ayant été nécessaire au réveil, administrée en IVSE sur 4 à 6 heures.

EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES : **Monitoring**

Risque d'effet rebond, la demi-vie de la naloxone est inférieure à celle de la morphine.

Surveillance étroite de la conscience.

Attention lors de la levée de la dépression respiratoire de ne pas faire réapparaître des douleurs trop importantes.