

# SALBUMOL®

## SALBUTAMOL

Amp. 5 mg/5 ml ou 0,5 mg/1 ml.

**FAMILLE** :  $\beta$ -2-mimétique, broncho-dilatateur, utérorelaxant, hypokaliémiant.

**INCOMPATIBILITÉS PHYSICO-CHIMIQUES :**  
**Solutions alcalines.**

**PRÉPARATION ET DILUTION : G5 %, NaCl 0,9 %.**

**PSE : 5 mg dans 50 ml soit 0,1 mg/ml (100  $\mu$ g/ml).**

5 ml



45 ml



50 ml



Prélever une ampoule de 5mg/5 ml

Ramener à 50 ml avec 45 ml de NaCl 0,9 % ou de G5 %

On obtient 5 mg/50ml soit 0,1mg/ml (100  $\mu$ g/ml)

**EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES** : Monitoring Tremblements, sueurs, agitation, œdème pulmonaire, céphalées, nausées, vomissements.

**Pour l'indication obstétricale, patiente en décubitus latéral gauche.**

**ECG avant l'injection.**

**Tachycardie, hypotension artérielle.**

**Glycémie et kaliémie avant l'injection et à la quatrième heure : risque majeur d'hyperglycémie et d'hypokaliémie.**