

TILDIEM[®]

DILTIAZEM

Lyophilisat. 25 mg et 100 mg.

FAMILLE : Inhibiteur calcique. Antiarythmique.

INCOMPATIBILITÉS PHYSICO-CHIMIQUES :

Dantrolène (Dantrium) : risque de fibrillation ventriculaire.
Association déconseillée avec
l'amiodarone (Cordarone) et l'esmolol.

PRÉPARATION ET DILUTION : **G5 %, NaCl 0,9 %.**

IVD : En bolus suivant le poids.

Administration sur 2 minutes.

PSE : 100 mg dans 50 ml, soit 2 mg/ml.

POSOLOGIE : Bolus de 0,3 mg/kg à passer sur 2 minutes, puis 0,3 mg/kg/h en IVSE.

PSE : 100 mg dans 50 ml, soit 2 mg/ml.

Posologie/Poids	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg
Bolus 0,3 mg/kg sur 2 min.	6 ml	7,5 ml	9 ml	10,5 ml	12 ml	13,5 ml
0,3 mg/kg/h	6 ml/h	7,5 ml/h	9 ml/h	10,5 ml/h	12 ml/h	13,5 ml/h

EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES : **Monitoring**

Manifestation vasodilatatrice : céphalées, malaise, palpitation, vertiges, bouffées vasomotrices et œdèmes des membres inférieurs.

Surveillance ECG étroite. Atropine si bradycardie.

Hypotension artérielle, bradycardie, BAV.

Potentialise l'action myorelaxante des curares.