

XYLOCAINE®

LIDOCAINE

Flac. 1 % : 200 mg/20 ml.

FAMILLE : Anesthésique local et antiarythmique.

DÉLAI D'ACTION : Tb du rythme : Immédiat.

Anesthésie : 10 minutes.

DURÉE D'ACTION : Tb du rythme : 20-30 minutes.

Anesthésie : 45-75 minutes.

INCOMPATIBILITÉS PHYSICO-CHIMIQUES :

**Aminophylline. CaCl. Pénicilline. Solutés alcalins.
Phénytoine (Dilantin). Adrénaline. Noradrénaline.
Isuprel. Amphotéricine B.**

PRÉPARATION ET DILUTION : **G5 %.**

PSE : 400 mg dans 40 ml, soit 10 mg/ml.

20 ml



20 ml



40 ml



Prélever 400 mg
dans un flacon
de 400 mg/20 ml

Ramener à 40 ml
avec du NaCl
0,9 % ou du
G5 %

On obtient
400mg/40 ml soit
10 mg/ml

POSOLOGIE : 1-1,5 mg/kg/heure en IVSE.

Posologie/Poids	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
1 mg/kg/h	4 ml/h	5 ml/h	6 ml/h	7 ml/h	8 ml/h	9 ml/h	10 ml/h
1,5 mg/kg/h	6 ml/h	7,5 ml/h	9 ml/h	10,5 ml/h	12 ml/h	13,5 ml/h	15 ml/h

EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES : **Monitoring**

Réaction allergique, nausées, agitation, convulsions.

Tachypnée. Hypotension artérielle, bradycardie.